

PRODUKTINFORMATION

Ultrana CimoCid Plus Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

Rel. 09/2024

CimoCid Plus eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten sowie in Lebensmittelbereichen, Industrie und privaten Haushalten. Die hygienische Händedesinfektion auf Alkoholbasis wirkt sofort. Die handliche Sprühflasche ist ideal für Kasacks, Handtaschen und auf Reisen.

- ✓ Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- ✓ Begrenzt viruzid Plus (inkl. Rota-, Noro und Adenoviren)
- ✓ Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Frei von Farb-, Duft- und weiteren Zusatzstoffen
- ✓ Mit allen Waschlotionen kompatibel
- ✓ VAH- und IHO gelistet
- ✓ HACCP konform

Inhaltstoffe:

100 g Lösung enthalten: 55,8 g Ethanol und 10,0 g 1-Propanol.
BAuA: Reg.-Nr. N-85853

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hilfsmittelnummer: 54.99.02.0001

Hersteller:

Dr. Schnell, Taunusstr. 19, D-80807 München,
www.dr-schnell.de/skincare, Tel.: 089-350 60 80

Anwendung:

CimoCid Plus in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Nebenwirkungen: Insbesondere bei sehr häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Gegenanzeigen: Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltstoffe anwenden. Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit
Hygienische Händewaschung, bakterizid und levurozid gemäß VAH. EN 1500	konz. 30Sek.*
Chirurgischen Händedesinfektion, bakterizid und levurozid Gemäß EN 12791	konz. 90Sek*
Tuberkulozid (M. terrae) gemäß EN 14348 hohe Belastung	konz. 30 Sek.*
Mykobakterizid (M.- terrae und M. avium) gemäß EN 14348 hohe Belastung	konz. 30 Sek.*
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV und Coronaviren) gemäß EN 14476 hohe Belastung	konz. 30 Sek.*
Begrenzt viruzid Plus (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren) gemäß EN 14476 niedrige Belastung	konz. 30 Sek *

*Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.

Verkaufseinheiten:

Karton mit 16 Flaschen à 500 ml

Karton mit 20 Sprühflaschen à 50 ml

Thekendisplay mit 20 x 50 ml

PZN 50 ml: 19428539, PZN 500 ml: 19428545



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.